

EXERCICE N°1 : Donnée : $1 \mu\text{C} = 10^{-6} \text{ C}$; Constante de la loi de coulomb : $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N.m}^2.\text{C}^{-2}$

Une charge électrique ponctuelle de valeur $q_1 = 2 \mu\text{C}$ est placée en un point O.

Le point O est l'origine d'un repère orthonormé (Ox, Oy). On considère dans ce repère : Le point A de coordonnées $x_A = 6 \text{ cm}$ et $y_A = 0 \text{ cm}$

1) a-On place maintenant en A une charge $q_2 = -4 \mu\text{C}$ L'interaction électrique s'exerçant entre deux charges q_1 et q_2 est-elle attractive ou répulsive ? Justifier.


b-Déterminer la valeur commune de la force d'interaction électrique $\|\vec{F}\|$ entre deux charges q_1 et q_2

c- Représenter sur la figure (1) la force exercée par la charge q_1 sur q_2 et la force exercée par la charge q_2 sur q_1 à l'échelle 1cm pour 10N.

2) Soit un point B de coordonnées $x_B = 3 \text{ cm}$ et $y_B = 3 \text{ cm}$. Déterminer les valeurs des vecteurs champs électriques $\vec{E}_1(B)$ et $\vec{E}_2(B)$ créés respectivement par la charge q_1 et par la charge q_2 au point B.

b- Représenter les vecteurs $\vec{E}_1(B)$ et $\vec{E}_2(B)$ à l'échelle 1cm pour 10^7 N.C^{-1} sur la figure

c- En déduire la valeur du vecteur champ électrique résultant créé par les charges q_1 et q_2 simultanément au point B. Représenter ce vecteur sur la même figure (1)



EXERCICE N°2 : Donnée : $1 \mu\text{C} = 10^{-6} \text{ C}$; Constante de la loi de coulomb : $K = 9 \cdot 10^9 \text{ S.I}$

Deux charges ponctuelles q_A et q_B tel que $q_B = 4q_A$; sont placées respectivement aux points A et B distants de d. Le spectre électrique de ces deux charges est donné par la figure 1 ci-dessous.


Les forces électriques $\vec{F}_{A/B}$ et $\vec{F}_{B/A}$ exercées respectivement par q_A sur q_B et par q_B sur q_A sont représentées à l'échelle : $2,5 \cdot 10^{-6} \text{ N} \rightarrow 1 \text{ cm}$ tandis que la distance d est représentée en utilisant une échelle : $1 \text{ cm} \rightarrow 1 \text{ cm}$.

1- En utilisant le graphe, donner en le justifiant le signe de q_A et de q_B .

2- Déterminer la distance d séparant les points A et B ainsi que la valeur de l'interaction électrique existant entre les deux charges q_A et q_B . Déduire la valeur de q_A et celle de q_B .


3- Trouver les caractéristiques du champ électrique créé par les deux charges q_A et q_B au point O milieu du segment [AB].

4- Une charge $q = -4\mu\text{C}$ est placée au point O. déterminer les caractéristiques de la force exercée par les charges q_A et q_B sur q .



EXERCICE N°3 :

Deux points A et B sont situés sur la circonférence d'un cercle de centre O et de rayon R tel que $R = AB = 6\text{ cm}$. En A et B on place respectivement deux boules ponctuelles chargées de même charge $q_A = q_B = 2.10^{-7}\text{ C}$ et de masses négligeables. (Figure ci contre).



1°) a- Donner les caractéristiques de $\vec{F}_{B/A}$
 b- Représenter (fig1) les forces électriques $\vec{F}_{A/B}$ et $\vec{F}_{B/A}$ qui constituent l'interaction électrique existant entre q_A et q_B .

2°) a- Représenter (fig1), au point O, les vecteurs champs électrostatiques de $\vec{E}_A$ et $\vec{E}_B$ créés respectivement par les charges q_A et q_B . Calculer la valeur de $\vec{E}_A$.

b- Déterminer les caractéristiques du vecteur champ électrostatique résultant $\vec{E}_O = \vec{E}_A + \vec{E}_B$ créé par l'ensemble des deux charges au point O. Représenter $\vec{E}_O$.

3°) Au point O, on place un corps ponctuel (C) de masse m qui porte une charge Q_0 , il prend une position d'équilibre stable. On donne $|Q_0| = 2.10^{-8}\text{ C}$


a- Représenter (fig2) toutes les force exercées sur la charge Q_0 . Quel est le signe de Q_0 ?

b- Ecrire la condition d'équilibre du corps ponctuel ($\square$).

c- Calculer la masse m du corps (C).

Echelle : 1cm $\rightarrow$ 0,1N

fig (1)



Echelle: 2cm $\rightarrow$ $5 \cdot 10^5 \text{N} \cdot \text{C}^{-1}$

fig(2)

