



* L'atome est formé par *un* noyau central chargé d'électricité positive autour duquel gravitent des électrons chargés d'électricité négative.

* L'atome est électriquement neutre alors $Q_{\text{atome}} = Q_{\text{noyau}} + Q_{\text{électrons}} = 0$.

* Le noyau atomique est formé par des particules dites **nucléons** qui peuvent être

des protons ou **des neutrons**.

- Le **proton** est de charge électrique **positive** : $q_{\text{proton}} = e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{C}$

et de masse $m_{\text{proton}} = 1,6727 \cdot 10^{-27} \text{kg} \approx 1,67 \cdot 10^{-27} \text{kg}$

- Le **neutron** est électriquement **neutre** $q_{\text{neutron}} = 0$

et de masse $m_{\text{neutron}} = 1,6749 \cdot 10^{-27} \text{kg} \approx 1,67 \cdot 10^{-27} \text{kg}$

$$m_{\text{proton}} = m_{\text{neutron}} = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{kg}$$

* **L'électron** est de charge électrique négative $q_{\text{électron}} = -e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{C}$ et de masse $m_{\text{électron}} = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{kg}$.

La masse d'un électron est négligeable devant la masse d'un nucléon

* L'atome ou le noyau atomique est représenté symboliquement par :




Schéma du noyau d'un atome

Le nombre de masse A correspond au nombre des nucléons.

Le numéro atomique Z correspond au nombre de protons.

N : nombre de neutrons tel que : $A = N + Z$.



Le nombre d'électrons dans l'atome est égal au numéro atomique Z

$$n_{\text{électrons}} \text{ dans l'atome} = Z.$$

$$Q_{\text{noyau}} = Z \cdot e$$

$$Q_{\text{électrons dans l'atome}} = -Z \cdot e.$$

✓ Si on néglige la masse des électrons par rapport à celle du noyau de l'atome, on obtient :

$$m_{\text{atome}} = m_{\text{noyau}} = A \cdot m_{\text{nucléons}}$$

Avec :

$$m_{\text{nucléons}} = m_{\text{protons}} = m_{\text{neutrons}} = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg.}$$

✓ La masse molaire atomique $M_x = N_A \cdot m_{\text{atome}}$


Avec :

$$N_A = 6,02 \cdot 10^{23} : \text{Nombre d'Avogadro.}$$

Approximativement :

$$M_x = A \text{ (g.mol}^{-1}\text{)}.$$

- ✓ L'élément chimique est l'ensemble des atomes et des ions ayant le même nombre de protons Z dans leurs noyaux.
- ✓ Les isotopes d'un même élément chimique sont les noyaux qui ont le même nombre de charge Z et différent nombre de masse A.




✓ La masse molaire atomique M_x d'un élément chimique, X, constitué de plusieurs isotopes

${}_{Z}^{A_1}\text{X}$ (a%) et ${}_{Z}^{A_2}\text{X}$ (b%) et :

$$M_x = \frac{a \cdot M_{Z}^{A_1 X} + b \cdot M_{Z}^{A_2 X}}{100} = \frac{a \cdot A_1 + b \cdot A_2}{100}$$



- ✓ L'élément chimique est l'ensemble des atomes et des ions ayant le même nombre de protons Z dans leurs noyaux.
- ✓ Les isotopes d'un même élément chimique sont les noyaux qui ont le même nombre de charge Z et différent nombre de masse A .



- ✓ La masse molaire atomique M_x d'un élément chimique, X , constitué de plusieurs isotopes

${}_{Z}^{A_1}X$ ($a\%$) et ${}_{Z}^{A_2}X$ ($b\%$) et :

$$M_x = \frac{a.M_{{}_{Z}^{A_1}X} + b.M_{{}_{Z}^{A_2}X}}{100} = \frac{a.A_1 + b.A_2}{100}$$

Exemple

Pour le cuivre on a ${}_{29}^{63}\text{Cu}$ et ${}_{29}^{65}\text{Cu}$ avec les proportions respectives de 69,17% et 30,83%. Les masses molaires atomiques du cuivre ${}_{29}^{63}\text{Cu}$ et du cuivre ${}_{29}^{65}\text{Cu}$ sont respectivement 63 et 65 g mol⁻¹. La masse molaire de l'élément cuivre est alors :

$$M = \frac{69,17 \times 63}{100} + \frac{30,83 \times 65}{100} = 63,546 \text{ g.mol}^{-1}$$